

## 画眉草亚科及黍亚族数新变种

陈守良 庄体德 杨锡麟

### SOME NEW VARIETIES OF ERAGROSTOIDEAE AND PANICINAE

Chen Shou-liang Zhuang Ti-de Yang Xi-ling

编写中国植物志(禾本科)时,在画眉草亚科与黍亚科中,除有些学报已发表一些新种外,尚发现下列数新变种。

#### 一、画眉草亚科 Eragrostoideae Pilger

##### 1. 刺叶獐毛 新变种

*Aeluropus pungens* (M. B.) C. Koch var. *hirtulus* S. L. Chen et X. L. Yang, var. nov. — *Aeluropus micrantherus* auct. non Tzvel, Clav. Pl. Xinjiang (新疆植物检索表) 1: 258. 1982.

A typo praesertim differt laminis foliorum superne dense hirtulis inferne laxae pilosis vel subglabris lemmatis prope margines laxae ciliatis et glumis prope margines subglabris vel pauciciliatis.

新疆(Xinjiang), 阿勒太地区(Altay Diqu) 额尔齐斯河(Erqis He) 沿岸, 低阶地的沙地和沙丘间, 1982年7月, 新疆八一农学院无号

陈守良、庄体德: 江苏, 南京, 江苏植物研究所 (Jiangsu Institute of Botany, Nanjing, Jiangsu).

杨锡麟: 内蒙: 呼和浩特, 内蒙古师范大学生物系 (Department of Biology, Nei Mongol Teacher's University, Hohhot, Nei Monggol)

(Coll. Agr. Aug.—1 Xinj. Sine num.) 模式标本存江苏省植物研究所标本室 (Holotypus in Herb. Jiangsu Institute of Botany)

本变种叶片上面密生刺毛，下面疏生柔毛，外稃边缘疏生纤毛，颖片边缘无纤毛或仅有数纤毛的性质，虽然与原变种有别，但其小穗长2—2.5毫米，花药长约1.2毫米，颖及外稃背部无毛，仅边缘有纤毛等特征均在 *Aeluropus pungens* (M. B.) C. Koch 范围内，而非密穗簕毛 *A. micrantherus* Tzvel 所有。根据 N. N. Tzvelev 所写密穗簕毛的原始记载为叶鞘无毛，叶片粗糙，外稃长2.5—3.2毫米，无毛，花药长0.6—0.8毫米 (vaginae glabrae...laminae...scrabrae...lemmata 2.5—3.2mm lg. ...glabrae; antherae 0.6—0.8mm lg.) 等特征均与本变种有明显的区别。

## 二、黍亚族 Panicinae

### 2. 无稃细柄黍

*Panicum psilopodium* Trin. var. *epaleatum* Keng, Clav. Gen. et Sp. Gram. Sin. (中国主要禾本植物检索表) 118, 220. 1957 et Fl. Illustr. Plant. Prim. Sin. Gram. (中国主要植物图说, 禾本科) 649, 658. 1959, sine lat. descr.

A typo praesertim differt palea prima nulla.

贵州 (Guizhou); 独山 (Du Shan), 生于林下阴处，海拔500米，1930年9月7日，蒋英 (Y. Tsiang) 6912模式标本存江苏植物所标本室 (Holotypus in Herb. Jiangsu Institute of Botany); 八寨 (Bazhai), 生长于海拔500米的山坡，1930年8月1日，蒋英 (Y. Tsiang) 6185.

云南 (Yunnan); E. E. Maire 6873, 6983, 勐海 (佛海) (Meng-xian) 王启无 (C. W. Wang) 77309.

与原变种的主要区别为第一内稃不存在。

### 3. 矮小囊颖草 新变种

*Sacciolepis myosuroides* (R. Br.) A. Camus var. *nana* S. L. Chen et T. D. Zhuang, var. nov.

A typo praesertim differt cubmis 15—30cm altis, laminis 3—5cm longis, 1—3mm latis, paniculis 2—4cm longis cire 3mm latis.

云南 (Yunnan); 西双版纳 (Xishuangbanna), 小勐养生物站

(Stopping-place for Xio-meng-yang Institute of Biology) 水边，  
海拔高780米，1963年8月1日，李植芝 (Z. C. Li) 模式标本存云南大  
学生物系标本室 (Typus in Herb. Yunnan University)

与原变种的主要区别为秆仅高15—30厘米，叶片长仅3—5厘米，宽  
1—3毫米，圆锥花序长仅2—4厘米，宽约3毫米。

\_\_\_\_\_ . . . \_\_\_\_\_